

Observation sur deux parotides Suite

D'une fièvre maligne.

Par M. Cuvier

Le 10. 8.^{bre} 1768. Je vis M.^r Duler Lieutenant de frégate, Cap.^{ne} de port à Cayenne, âgé de trente ans, d'une — Constitution sèche, maigre, Rarement sujette aux — maladies et à qui La fièvre venoit de prendre. —

Depuis six mois cet officier Eprouvoit un — malaise accompagné de l'assitude Spontanée, d'un — Sommeil Inquiet, Interrompu; ce qu'il attribuoit à un — Grand Sujet de chagrin au quel Il s'Étoit Beaucoup — Livré; en outre Il n'i avoit qu'environ un mois et demi — qu'il Étoit arrivé de France en cette Colonie.

Il s'Étoit purgé La veille à l'occasion d'une — douleur qu'il Ressentoit, depuis une huitaine de jours — dans la Région Lombaire droite, mais La médecine — n'avoit produit que très peu d'Effet.

Il avoit La Bouche pâteuse, amère, Le ventre — tendu et une Grande Soif; la fièvre n'Étoit pas — Considerable, néanmoins Il ne pouvoit Garder un — moment La même Situation. Je le mis à l'usage d'une — Limmonade Légère pour Boisson Commune, de Saignai — du Bras vers La chute du paroxysme, et lui ordonnai — deux Sarcemens émollients.

Le 2.^d jour L'amertume de La Bouche, L'abondance — de la Salive et L'Enflure de L'abdomen Indiquant que les — humeurs étoient en turgescence, Je le purgeai avec une



once de tamarin, trois Gros de follicules de Séné, deux Gros de Sel de Seignette et deux onces de manne pour deux doses. La fièvre qui étoit Remittente Redoubla deux heures après L'Effet de la medecine, qui ne vuida pas beaucoup le malade, mais Le paroxysme ne fût pas violent. Le Soir Il prit un lavement de Graines de lin qui fit un peu d'Effet.

Le 3.^e jour la fièvre fût un^{peu} plus forte, mais point accompagnée de mal de tête ni de Reint. Je me bornai à Prescrire au malade, vers la chute de L'acut, — quelques Lavemens émolliens, du Boüillon[#] et de la crème de Riz alternativement.

devolaille.

Le 4.^e jour Il fût purgé avec un aporème tel que le précédent: Il n'en prit qu'une dose quil garda environ une heure, et L'ayant Rejetée Il continua de vomir pendant Sept a huit heures presque tout les Liquides qu'on lui donnoit, mais sans Efforts et sans aucun mélange de matieres Critiques. Je le mis a L'usage d'une Emulsion légèrement nitrée, quil prenoit en petite quantité et avec plaisir, Etant tourmenté par la Soif. — Je fis cesser les vomissements au moyen de quelques cuillerées de la potion de Oliviere, et en laitant Le ventre avec des lavement de Graines de lin, qui lui firent rendre beaucoup de matieres Biliées. La chaleur Externe n'étoit pas Considerable, non plus que la fièvre, mais L'haleine étoit Brûlante, La Bouche toujours amère et Le malade ne dormoit point.

Le 5.^e jour la fièvre ne fût pas forte. Je lui ordonnois, vers son déclin, quelques lavement émollient et pour ^{soutenir} ~~augmenter~~ ses forces du Bouillon de volaille et de la crème de Miel.

Le 6.^e jour Il fût purgé avec l'apozème suivant: tamarin, manne de chaque deux onces, follicules de Séné-trois Gros, sel de nitre un Gros et demi, pour trois doses. Les évacuations furent Biliueuses, mais peu abondantes et la fièvre peu Considerable.

Le 7.^e jour La fièvre quoi que peu forte en apparence étoit accompagnée d'une anxiété continuelle et d'une — insomnie accablante, cependant le malade se plaignoit peu de la tête. Je lui prescrivis Beaucoup d'Emulsion nitrée, pour calmer la soif qui se soutenoit et vers la chute du paroxysme plusieurs Lavement émollient.

Le 8.^e jour Il fût purgé en une dose. les déjections furent a peu près Semblables aux précédentes, mais peu Copieuses. La fièvre fût médiocre et le malade fit plusieurs tour dand sa chambre.

Le 9.^e jour au matin Il me dit qu'il sentoît une douleur vers l'oreille droite. J'examinai la partie, et trouvai la parotide un peu tumescée, c'est à dire de la grosseur d'un haricot. J'ordonnois qu'on y fit quelques embrocations d'huile chaude. vers les six heures du soir, ~~et~~ au commencement du paroxysme, Il tomba dans une affection soporeuse, de la nature du Carus accompagnée de Soubresauts et de Spasmes périodiques dans les



muscles des Bras, Il avoit Les yeux fermés, les dents serrées, le visage pâle, le pouls plein, la Respiration Etoit aisée, paisible, mais Il n'avoit plus aucune perception: on avoit Beau L'agiter de toute maniere — L'appeller, le piquer avec une Epingle, Ses organes — n'Etoient affectés d'aucune Sensation.

Je lui fis dans l'Instant une copieuse Saignée du pied. les Spasmes cefferent, et le malade fit un Leger mouvement de tête, La femme L'ayant appelé par son nom, Il ouvrit Les yeux et les Referma tout de suite, c'est tout ce qu'on put tirer de lui. Il Resta dans cet Etat Jusque vers les deux heures après minuit qu'il Recouvrit Ses Sens et les mouvements volontaires. Il se plaignit aussitôt d'une douleur dans Le Bas ventre, causée par une Suppression totale d'urine. Je fis appliquer, Sur la Region hypogastrique un Cataplasme émollien, et ordonnai qu'on lui administrât d'heure a heure un demi Lavement de Graines de lin.

Le 10.^e Jour, vers les Six heures du matin, Je Le mis a L'usage des Bains de plantein, et a celui du petit Lait pour Boisson Commune. vers les dix heures Il commença a uriner un peu, et vers les trois heures après midy les urines passaient très librement. Il Continua toute la Journée L'usage des Bains, presque Sans Interruption. vers le Soir Je trouvai que la parotide avoit Beaucoup Grossi, Soit naturellement ou par L'Effet d'une emplâtre de diacubum que J'y avois.

appliqué la veille.

et dans la
Suite du
Basidium.

Le 11.^e Jour L'engorgement de cette Glande faisant un progrès Rapide, je substituai à l'Emplâtre un Cataplasme de pain et de lait, au quel on ajoutoit un peu d'huile d'olive, et je Bornai La nourriture du malade à de la Crème de Riz fort légère.

Le 14.^e Jour La parotide du côté gauche fort tumescée indiquoit un nouveau dépôt. ce lui du côté droit étoit très Considerable; L'humeur morbifique se portoit à la tête avec une affluence, dont les Suites m'effrayoient. vers les dix heures du matin l'Etat des choses me fit appréhender la Suffocation du malade. pour La prévenir, je me decidai à le purger dans l'Instant. La médecine fut composée d'un Gros de ~~Jalap~~ Jalap en poudre de deux Gros de Sucre Rasiné mis au Jalap par La trituration afin de lui Servir de Corectif et de la Crème de Riz très légère pour la véhicule. L'engorgement des parties, qui Servent à la déglutition étoit déjà si Considerable, que le malade ne put avaler la médecine que par Cuillerée. Ce Remède lui fit rendre une grande quantité d'humeurs Bileuses et très fétide. ce qui Rendit La Respiration et la déglutition moins pénibles.

Le 15.^e Jour. L'Enflure du visage absorboit presque Les yeux du malade: Il ne pouvoit entrevoir les objets que par une petite ouverture, qui étoit encore à sa disposition vers le Grand angle de l'œil gauche. La tumeur du côté droit approchoit de ce degré de maturité



Convenable, dans les dépôts de cette Espèce, a L'application
d'un Caustique: ~~L'application~~, ~~L'application~~ elle avoit de la chaleur
de la Rougeur, Etoit fort grosse, médiocrement dure; le
doigt y Laissoit une légère Impression. tel est a peu près
L'Etat ou les parotides doivent être pour y appliquer le
Cautere: Si elles sont trop dures, trop éloignées de leur
maturité, qu'elles ne contiennent qu'une petite collection de
pus, L'action du caustique, ~~est~~ ^{est} donnée, pour ainsi dire, a
La Surface de la tumeur, ne procure qu'une fonte
très imparfaite et conséquemment une mauvaise Suppuration;
d'où résulte assez souvent un ulcère ^{sinueux} ~~phlegmoneux~~ qu'on a
Bien de la peine a Guérir, j'ai eu occasion de le voir plus
d'une fois a Cayenne, ou ces dépôts sont assez communs.

pour accélérer La fonte, et ^{la} Suppuration de cette tumeur
J'y appliquai la pierre a cautere, et procedai comme il Suit:
Je pris un morceau de diachylum Gommé, le pétris entre
mes doigts que j'oiugnoit d'huile de tenné en tenné, pour
le Rendre Glutineux, Capable de s'attacher fortement a
la partie, et par la d'Empêcher le caustique de
S'Etendre et de faire une trop Grande Escarre, puis,
en ayant formé une Emplâtre, Je pratiquai dans
Son milieu une ouverture d'un pouce et demi de
Longueur, Sur trois a quatre lignes de largeur, —
L'appliquai Sur La tumeur de façon que L'ouverture
se trouvoit Sur L'Endroit Le plus Saillant, y mis
une trainée de pierre a cautere, que Je couvris d'un
petit petit plumaceau un peu mouillé, afin de favoriser

Son action, et pour contenir le tout j'appliquai —
par dessus une petite emplatre préparée comme la
précédente.

vers les deux heures après midy l'Engorgement
Étoit terrible: Les maxillaires, Les Sublinguales
en un mot toutes Les Glandes Recouvertes par
La membrane de Schneider en étoient affectées; la
Gorge étoit presque au niveau du menton; la
Respiration étoit très La Borieuse, la Déglutition
empêchée; les liquides qu'on essayoit de faire
avaler au malade, par cuillerée étoient Repercutes —
et sortoient par les narines.

Cependant la fluxion n'étoit pas a son période;
L'abcès du Côté gauche grossissoit a vue d'œil, et
celui du Côté droit étoit encore susceptible d'augmentation,
vu que le cautere n'avoit operé qu'une partie de
son Effet: cet état étoit d'un sinistre présage; le
malade avoit Besoin d'être Secouru sans délai et
Les moyens devoient être décisifs. aucun ne me parut
mieux convenir qu'une Saignée Revulsive Secondée
d'un purgatif. Il est vrai que ces Remèdes pouvoient
faire Refluer dans le Sang une partie de l'humour
critique, quoi que L'action du cautere fût contraire
a cet Effet, mais de deux maux Il s'agissoit d'éviter
Le plus Grand, qui étoit La Suffocation du malade.
au Reste en employant ces moyens, qui au jugement
des médecins paroîtront peut être un peu hardis, c'étoit nous conformer



a cette maxime d'hypocrate qui dit : aux grands maux
il faut de grands remèdes.

en conséquence je le saignai du pied dans l'instant,
et le purgeai une heure après comme le jour précédent ;
La saignée ayant rendu la déglutition assez libre pour
Le passage des liquides administrés par cuillerée. Les
Evacuations furent copieuses et a peu près de la
nature de celles de la veille. Ces secours mirent, en
peu de tems, le malade en état de satisfaire La Soif
qui le tourmentoit.

vers les neuf heures du soir, ~~une~~ La fluctuation
au dépôt, ou j'avois appliqué le caustique, étoit encore
fort obscure, très Equivoque, ou plutôt n'étoit pas sensible.
persuadé cependant qu'il contenoit une abondante collection
de pus ; que l'engorgement des parties voisines étoit ce
qui empêchoit de la reconnaître, assez distinctement au tact,
je me décidai à l'ouvrir ; par ce que ces sortes de tumeurs
sont sujettes à délitescence, lors qu'on tarde trop à les vider.
voicy comment je procedai : je fis avec la lancette une
ponction au dessous de la partie inférieure de l'escarre,
en dirigeant l'instrument vers la glande ou est
ordinairement le foyer du pus, la matière purulente
paraissant au dehors, je retirai la lancette, et introduisis
a sa place une sonde canelée, puis avec un bistoury droit,
Guidé par ce conducteur, je fis une incision longitudinale
d'environ quatre travers de doigt, la quelle, divisant
l'escarre dans toute son étendue, se terminoit a

11
Ca
qu
can

une couple de lignes au dessous de la partie —
Inferieure de l'oreille et se finit a l'ordinaire.

Il Sortit Beaucoup de pus Blanc, Epais, Bien —
digeré. La Suppuration fut abondante pendant les
quatre a cinq premiers jours: elle diminua ensuite
par degré. vers le quinzième jour, l'ulcère se trouva
parfaitement détergé et guéri vers la fin du mois.

J'ouvris le second dépôt quatre jours après. le
pus me parut aussi. Louable que celui du premier, mais
un peu moins abondant. d'ailleurs je me conduisis pour
l'amener a suppuration et pour le reste, comme dans
le précédent.

Dans les premiers pansement je me servis d'un
d'un onguent consomptif composé d'une once de Basilium
et douze a quinze grains de pierre infernale en poudre
Bien Incorporés ensemble, j'en charge un plumaceau
que je mets dans le fond de l'ulcère, et par dessus celui
la plusieurs autres enduit d'un digestif fait avec la
térébenthine, le jaune d'œuf et le taffia. # quand la
glande est entièrement détruite, j'achève la cure avec
le digestif seulement. pour consolider la playe j'use
d'une Emplâtre déscicative composée de deux parties
d'onguent de la mere et d'une d'onguent Citrin Bien
mêlés. par ce moyen je forme une bonne cicatrice, Bien
unie, Bornée au niveau de la peau, ce qu'on obtient par
avec de la charpie sèche, qui ordinairement fait des
cicatrices défectueuses, et que l'on doit éviter Surtout

Eau de vie
quantité des
cannes a sucre



aux parties Exposées a la vue.

peu de jours après, L'ouverture de la dernière —
parotide, Il se fit une éruption miliaire cutanée, entre
mêlée de grosses pustules, a peu près Semblables a
celles de la petite vérole: les parties postérieures de
La poitrine, Le cou, les Epaules et les Bras en furent
pour ainsi dire Le Siège; les extrémités inférieures
n'en furent point affectées; cette éruption dura environ
trois semaines.

Le sang par cette voye se débarrassa de la portion
d'humeur morbifique, qui s'y étoit introduite par l'effet
des saignées du pied, aux quelles nous avions été
nécessité de Recourir, pour sauver le malade, du
péril évidant, dont Il étoit menacé.

Il éprouva encore, a la suite de cette maladie, des
douleurs ambulantes, périodiques, qui attaquoient,
tour a tour, les ~~Costes~~ articulations des Extrémités, tant
Supérieures qu'Inférieures; c'est a dire, les Genoux, les
maléoles, les doigts des pieds et des mains &c. elles
se sont dissipées avec le tems, L'usage des topiques
Résolutifs, joint a celui des Sudorifiques et des
purgatifs fondants. cet officier est lieutenant de port
a Rochefort; Il étoit a parin a la paque dernière et se
portoit aussi bien qu'il n'avoit fait de Savie.

Je certifie que L'observation cy dessus rapportée par M.^r
Campet, qui ma guérie de cette maladie contre toute Esperance même
de la part des gens de l'art, est Exacte en tout ce quelle contient.

a Cayenne le 18. avril 1771. Duler. L'Epouse du malade est
a Paris chez M. Le marquis de Ximenes, Rue neuve des petits champs
celle qui La soigna dans cette maladie.

Campet

ancien chirurgien major des hôpitaux de la marine à
Cayenne, correspondant de l'Académie Royale de chirurgie,
pensionné du Roy.



nº 185.